




Intra-articulaire injecties





U heeft gewrichtspijn die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld slijtage van het kraakbeen (artrose) of irritatie van het gewrichtskapsel. De revalidatiearts behandelt u met een intra-articulaire injectie. In deze folder leest u meer over deze behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

Wat is een intra-articulaire injectie?

Een intra-articulaire injectie is een injectie in een gewricht, dat wil zeggen binnen het gewrichtskapsel. Bijvoorbeeld in een knie, schouder, heup of pols.

Meestal gebruikt de arts hiervoor een combinatie van een verdovingsmiddel en een bijnierschors-hormoon. Bijnierschors-hormonen verminderen pijn en zwelling.

Hoe lang werkt de injectie?

De werking verschilt per persoon. Gemiddeld werkt een injectie enkele maanden.

Bijwerkingen

In het algemeen treden na een injectie weinig of geen bijwerkingen op.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- pijn op de plek waar de injectie is gegeven;
- de huid rond deze plek kan rood worden of warm aanvoelen;
- bij vrouwen kan de menstruatiecyclus tijdelijk ontregeld raken door het hormoon;
- bij mensen met diabetes kan de bestaande diabetes mellitus tijdelijk ontregeld raken;
- een bacteriële ontsteking van het gewricht; dit komt voor bij minder dan 1 op de 20.000 injecties, maar is een ernstige bijwerking.

Nazorg

Soms krijgt u advies om het gewricht 24 uur te ontzien. Nemen de klachten toe? Of krijgt u koorts na de tweede dag? Neem dan contact op met uw revalidatiearts of huisarts.





T 088 - 31 32 000
W www.libranet.nl

LRA-REV, mei 2019 - mei 2020

Locatie Blixembosch

Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven
E blixembosch@libranet.nl

Locatie Weert

p/a Zorgcentrum St. Martinus
Vogelsbleek 1, ingang Boerhaavestraat
6001 BE Weert
E weert@libranet.nl

Locatie Leijpark

Prof. Stoltehof 3
5022 KE Tilburg
E leijpark@libranet.nl

